

## تذكرة

- استخدام المكابيل المرقق في العبوة، وعدم استعمال الملاعق الصغيرة أو المكابيل الخاصة بأدوية أخرى، وذلك لتقليل مخاطر حدوث أخطاء في قياس الجرعة.

- تجنب استخدام كل من الإيبوبروفين والباراسيتامول سوياً أو بالتناوب، نظراً لزيادة احتمال حدوث الآثار الجانبية، التي قد تترافق.

- استخدام الإيبوبروفين وأو الباراسيتامول لا يمنع حدوث التشنجات الحرارية.

## جرعة الأدوية من أجل ارتفاع درجة الحرارة والألم

كتيب معلومات يعده ويشاركه أطباء الأطفال المختارين بحرية وأطباء الأطفال في مستشفيات هيئة الوحدة الصحية المحلية - منشأة العلاج والرعاية ذات الطابع العلمي في ريجو إيميليا

**الباراسيتامول لكل كجم**

الجرعة

15-10 ملجم لكل كجم من وزن الجسم، التكرار مرة كل 6-8 ساعات.

مثال

10 كجم من الوزن = 100-150 ملجم من الباراسيتامول، التكرار مرة كل 6-8 ساعات.

**الحد الأقصى للجرعة اليومية**

80 ملجم لكل كجم من الوزن، وذلك في حالة الأطفال الذين يكون وزنهم أقل من 50 كجم.

3 جم بالنسبة للأطفال الذين يزيد وزنهم عن 50 كجم.

**الإيبوبروفين لكل كجم (بدايةً من الشهر الثالث**

ومن وزن يتجاوز 6 كجم)

الجرعة

10 ملجم لكل كجم من وزن الجسم، التكرار مرة كل 8 ساعات.



مثال

10 كجم من الوزن = 100 ملجم من الإيبوبروفين، التكرار مرة كل 8 ساعات.

**الحد الأقصى للجرعة اليومية**

30 ملجم لكل كجم من الوزن، وذلك في حالة الأطفال الذين يكون وزنهم أقل من 50 كجم.

1200 ملجم لدى الأطفال الذين يتجاوز وزنهم 50 كجم.



## الإيبوبروفين

بديل للباراسيتامول، بدايةً من الشهر الثالث من العمر ومن وزن يزيد عن 6 كجم.

متاح في الأسواق في صورة: شراب وأقراص وأكياس لمستحضر يذوب في الفم وقطرات، وذلك بحسب العمر.

## الجرعة

10 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم (على سبيل المثال 10 كجم من الوزن = 100 ملجم من الإيبوبروفين)، التكرار مرة كل 8 ساعات.

## الحد الأقصى للجرعة اليومية

30 ملجم لكل كجم من الوزن، وذلك في حالة الأطفال الذين يقل وزنهم عن 50 كجم، أو 1200 ملجم لدى الأطفال الذين يزيد وزنهم عن 50 كجم. من الأفضل تناوله على معدة ممتلئة وتوفير قدر ملائم من السوائل عن طريق تقديم مشروبات للماء، ولو بكميات قليلة ولكن مرات كثيرة.

لا يستعمل في حالة وجود إصابة بجدرى الماء والإسهال.

اتبع دانماً التعليمات المذكورة داخل العبوة.

## مقدمة

**الباراسيتامول والإيبوبروفين** هما من الأدوية المفضلة التي تُشتمل في حالة ارتفاع درجة حرارة الأطفال أو إصابتهم بالألم.

يُفضّل التناول عن طريق الفم، فهذا يتيح قياس جرعة الدواء جيداً على خلاف اللبوس (التحاميل)، الذي يجب استعماله فقط في حالة وجود قيء أو رفض تناول الدواء بالفم.

**لا تعطِ الأسيرين**  
(حمض الساليسيليك) لمن يقل عمرهم عن 12 عاماً

## الأدوية

### - الباراسيتامول

يُستعمل أيضاً مع حدثي الولادة، متاح في الأسواق على هيئة قطرات وشراب وأكياس وأقراص وتركيبات يذوب في الفم، وذلك بحسب العمر.

### انتبه

لا تخلط بين المستحضرات المتوفرة في صورة قطرات وبين الشراب لتجنب خطر إعطاء جرعة زائدة.

## الجرعة

15-10 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم (على سبيل المثال 10 كجم من الوزن = 150-100 ملجم من الباراسيتامول)، التكرار مرة كل 8-6 ساعات، إذا استمر لدى الطفل ارتفاع درجة الحرارة وإذا استمر ظهور التردد عليه أو إحساسه بالألم.

## الحد الأقصى للجرعة اليومية

80 ملجم لكل كجم من الوزن، وذلك في حالة الأطفال الذين يقل وزنهم عن 50 كجم، أو 3 جم لدى الأطفال الذين يزيد وزنهم عن 50 كجم.

اتبع دانماً التعليمات المذكورة داخل العبوة

